



República de Moçambique
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

•SEMINÁRIO CAPACITAÇÃO DE FORMADORES DOS INSTITUTOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM TEMAS TRANSVERSAS SUA INCORPORAÇÃO NOS PLANOS DE AULAS

ABORTOS

Maio , de 2023



Conceito

- **Aborto** é a interrupção de uma gravidez resultante da remoção de um embrião ou feto antes de este ter a capacidade de sobreviver fora do útero.
- O aborto pode acontecer por vários factores, com destaque para factores biológicos, psicológicos e sociais.

Tipos de aborto

Existem dois tipos de abortos: aborto espontâneo ou natural e o aborto provocado ou induzido.

☐ **Aborto espontâneo**

- Ocorre de forma espontânea ou "interrupção involuntária da gravidez". É a expulsão não intencional de um embrião ou feto antes das 24 semanas de idade gestacional.

☐ **Aborto Provocado ou induzido**

- O aborto provocado ou induzido, também denominado por interrupção voluntária da gravidez, é o aborto causado por uma ação humana deliberada. Ocorre pela ingestão de medicamentos ou por métodos mecânicos.

Tipos de Aborto

- **O aborto provocado ou induzido** é um procedimento usado para interromper uma gravidez que acontece com consentimento da gestante.
- O aborto provocado pode ser considerado **legal**, quando a interrupção da gravidez é feita de acordo com a lei vigente no país, envolvendo médicos e em condições apropriadas e seguras para a sua realização.
- O aborto provocado é considerado **ilegal** quando a interrupção da gravidez ocorre sem a observância da lei em vigor, quando é feito por pessoas não autorizadas, pessoal não médico ou/e em locais inseguros. Este tipo de aborto constitui um problema sério de saúde pública, pois é causa do aumento da mortalidade e morbidade materna, sobretudo em adolescentes e jovens.

As causas mais comuns de aborto

Abortos ocorrem em todas as faixas etárias, por várias razões, tais como:

Relacionadas com a gestante

- Infecções e anomalias no útero;
- Problemas hormonais (mulher com problemas da tiroide);
- Problemas com a gravidez;
- Idade avançada da gestante;
- Gestantes com hipertensão arterial;
- Pacientes com diabetes descontrolada;
- Infecções de transmissão sexual como a sífilis e o HIV.

As causas mais comuns de aborto

Relacionados com o feto

- Má formação do feto.

Relacionados com factores sociais e económicos

- Uma gravidez indesejada ou não planeada;
- Falta de acesso aos serviços de contracepção ou planeamento familiar;
- Falha no método contraceptivo usado;
- Coerção sexual, estupro ou abuso sexual;
- Uniões prematuras.



Muito Obrigado!

